

Así que deja de lado los  
prejuicios...

*«¡Las ITS solo les pasan a los  
demás!»*

**... e infómate.**

### Nuestras herramientas de información



Pídelas de forma gratuita  
en nuestro sitio web:

[actions-traitements.org/nos-outils/commandes](https://actions-traitements.org/nos-outils/commandes)

### Nuestra línea de atención telefónica



en **WhatsApp** al +336 66 45 47 03  
de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 primer  
contacto **por mensaje**

(conversaciones confidenciales, voluntarixs capacitadxs)



**ACTIONS TRAITEMENTS**

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél: 01 43 67 66 00

[at@actions-traitements.org](mailto:at@actions-traitements.org)



Realizado con el apoyo financiero de Santé Public France y el Ministerio de Salud

# HABLEMOS DE

## La prevención de ITS,

Sexo, rollo,  
amor y  ITS\*:

 ¡Protéjete  
y hazte  
 pruebas!

No tirar basura en la vía pública - Febrero de 2026

\*ITS = Infecciones de transmisión sexual



# ¿Sabías que las ITS pueden ser asintomáticas?

Sin embargo, hacerse pruebas periódicas permite:

- Diagnosticar y tratar rápidamente las infecciones
- Proteger su salud y la de tus parejas
- Prevenir complicaciones graves

## ¿Cuándo hay que hacerse pruebas?

- Después de una relación sexual de riesgo o en caso de duda
- Si una pareja te informa que tiene una ITS
- Cada tres meses si tiene varias parejas
- Antes de dejar de usar condones con tu pareja

## ¿Dónde hacerse la prueba?

En los CeGIDD\* o en un laboratorio de análisis. Es gratuito (sin adelantar gastos para los menores de 26 años, sin receta médica y sin cita previa).

Más información en [questionsexualite.fr](http://questionsexualite.fr)

\*Centro gratuito de información, detección y diagnóstico. Lista disponible en la página web de Sida Info Service.

ITS	¿Cuándo hacerse la prueba?	Tratamiento
Clamidia	> 10 días	Antibiótico
Gonorrea	> 1 semana	Antibiótico
Hepatitis B	> 2 meses	Antiviral, riesgo de cronicidad Vacuna disponible
Hepatitis C	> 3 meses	Antiviral, riesgo de cronicidad
Herpes	Si hay síntomas	Antiviral oral
VPH	Mujeres: después de los 25 años HSH*: si hay síntomas	Sin tratamiento Vacuna disponible
Sífilis	>4 semanas	Antibiótico
Tricomonas vaginalis	>4 semanas	Antibiótico
VIH	> 6 semanas (análisis de sangre) y > 3 meses (Prueba rápida o autodiagnóstico)	Sin cura Tratamiento de por vida

\*HSH = Hombres que tienen Sexo con Hombres