

Así **que deja**
de hacer comentarios del tipo...
*«¡Para protegerse del VIH, nada
mejor que el condón!»*
... e infórmate.

Nuestras herramientas de información



Pídelas de forma gratuita
en nuestro sitio web:

actions-traitements.org/nos-outils/commandes

Nuestra línea de atención telefónica



en **WhatsApp** al +33 6 66 45 47 03
de lunes a viernes de 10:00 a 18:00
primer contacto **por message**

(conversaciones confidenciales, voluntarixs capacitadxs)



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél: 01 43 67 66 00

at@actions-traitements.org



HABLEMOS DE **la** prevención del VIH



La PrEP*
solo protege
contra **el VIH...**

¡y eso ya es
MUCHO!

*PrEP = Profilaxis preexposición



La PrEP es para todas las personas que la necesitan

- Para quienes quieran sentirse **más realizadxs** y segurxs en su sexualidad
- En caso de dificultad para usar o negociar el uso del condón
- Para quienes tienen relaciones con **múltiples parejas**, abiertas, polígamas o poliamorosas
- Para usuarixs de **drogas**
- Para trabajadorxs **sexuales**
- Para mujeres, hombres, cis, trans, etc.

Recordatorio

- 2 opciones de tratamiento: **1 comprimido al día** o **1 inyección cada dos meses**
- ¡Cuidado! No confundas la PrEP con la PEP, que es el tratamiento de emergencia que hay que tomar en las 48 horas siguientes a una situación de riesgo

¿Qué es la PrEP?

La PrEP es un tratamiento **preventivo** que permite a las personas seronegativas (que no tienen el VIH) **protegerse eficazmente contra el VIH.**

¿Cómo se obtiene la PrEP?

- Con receta médica de un médico de cabecera o cualquier especialista
- En la ciudad o en el hospital
- De **forma gratuita** en el CeGIDD*, incluso sin seguro médico
- Cubierta al 100 % por la seguridad social y para los beneficiarios de la A.M.E. o la C.S.S.

*Centro gratuito de información, detección y diagnóstico. Lista disponible en la página web de Sida Info Service.

Tomar la PrEP significa someterse a un seguimiento completo de su salud sexual.

Esto incluye, en particular, la **detección de todas las ITS** (como la clamidia, la gonorrea y la sífilis) **cada tres meses y su tratamiento si es necesario.**