

Alors on arrête
avec les idées reçues...

«Les IST, c'est juste
pour les autres!»

... et on s'informe.

Nos outils d'information



Commandez gratuitement nos outils
sur notre site internet:
actions-traitements.org/nos-outils/commandes

Notre ligne d'écoute



sur WhatsApp au 06 66 45 47 03
du lundi au vendredi de 10h à 18h
premier contact par message
(échanges confidentiels - bénévoles formé-es)



ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél: 01 43 67 66 00
at@actions-traitements.org



Réalisé avec le soutien financier de Santé Publique France et du Ministère de la santé

La prévention des IST,
ON EN PARLE?!

Sexe, plan,
amour et **IST***:

**protégez-vous
et faites-vous
dépister!**

Ne pas jeter sur la voie publique - Octobre 2025

*IST = Infections Sexuellement Transmissibles



Saviez-vous que les IST peuvent être asymptomatiques ?

Pourtant, un dépistage régulier permet de :

- Diagnostiquer et traiter rapidement les infections
- Protéger votre santé et celle de vos partenaires
- Prévenir les complications graves

Quand se faire dépister ?

- Après un rapport à risque ou en cas de doute
- Si un-e partenaire vous informe d'une IST
- Tous les 3 mois si vous avez plusieurs partenaires
- Avant d'arrêter le préservatif avec votre partenaire

Où se faire dépister ?

Dans les CeGIDD* ou dans un labo d'analyse.
Gratuit (sans avance de frais) pour les moins
de 26 ans, sans ordonnance et sans rendez-vous.

Plus d'information sur questionsexualite.fr

* Centre Gratuit d'Information, de Dépistage
et de Diagnostic. Liste sur le site de Sida Info Service.

IST	Quand se faire dépister ?	Traitement
Chlamydia	> 10 jours	Antibiotique
Gonorrhée	> 1 semaine	Antibiotique
Hépatite B	> 2 mois	Antiviral, risque de chronicité Vaccin disponible
Hépatite C	> 3 mois	Antiviral, risque de chronicité
Herpès	Si symptômes	Antiviral oral
HPV	Femmes: après 25 ans HSH*: si symptômes	Pas de traitement Vaccin disponible
Syphilis	> 4 semaines	Antibiotique
Trichomonas vaginalis	> 4 semaines	Antibiotique
VIH	> 6 semaines (prise de sang) et > 3 mois (TROD ou autotest)	Pas de guérison Traitement à vie

* Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes